

品
名

犬用慢性心不全用ピモベンダン製剤

ベトメディン[®] 1.25mg / ベトメディン[®] 5mg

87 9219

摘

■ 有効成分・分量

ベトメディン 1.25 mg 1錠中, ピモベンダン 1.25 mgを含有する。

ベトメディン 5 mg 1錠中, ピモベンダン 5.0mgを含有する。

■ 効能・効果

犬：僧帽弁閉鎖不全による慢性心不全に伴う症状の改善

■ 用法・用量

体重 1 kg当たりピモベンダンとして 0.25 mgを 1 回量とし, 1 日 2 回、朝夕おおよそ 12 時間間隔で経口投与する。

尚、体重別には次の投与量による。(1.25 mg錠及び 5 mg錠を組み合わせの場合)

体重 (kg)	1.25 mg	2.5 mg	5 mg
2.0 kg以上 - 3.6 kg未満	½ 錠		
3.6 kg以上 - 6.6 kg未満	1 錠		
6.6 kg以上 - 8.6 kg未満	1 ½ 錠		
8.6 kg以上 - 12.0 kg未満		1 錠	
12.0 kg以上 - 14.0 kg未満	½ 錠	1 錠	
14.0 kg以上 - 17.0 kg未満	1 錠	1 錠	
17.0 kg以上 - 19.0 kg未満	1 ½ 錠	1 錠	
19.0 kg以上 - 23.0 kg未満			1 錠
23.0 kg以上 - 28.0 kg未満	1 錠		1 錠
28.0 kg以上 - 34.0 kg未満		1 錠	1 錠
34.0 kg以上 - 37.0 kg未満	1 錠	1 錠	1 錠
37.0 kg以上 - 43.0 kg未満			2 錠

上記は目安であり、例えば、5mg錠1錠は1.25mg錠4錠で代用できる。

要

■ 使用上の注意

[一般的注意]

- (1) 本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方せん・指示により使用すること。
- (2) 本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
- (3) 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。

[使用者に対する注意]

- (1) 誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。

[犬に対する注意]

1. 制限事項

- (1) 本剤は体重 2 kg未満の犬には投与しないこと。
- (2) 本剤は食餌のおおよそ 1 時間前に投与すること。
- (3) 妊娠犬及び哺乳犬に対する安全性は確立されていないので、妊娠中及び授乳中の犬には投与しないこと。やむを得ず、授乳中の犬に投与する場合には、授乳を中止すること。
- (4) 肥大性心筋症あるいは機能的又は解剖学的に心拍出量の増加が見込めない症例（例えば大動脈弁狭窄症）には用いないこと。
- (5) 重度な肝障害を有する犬には慎重に投与すること。

